

## **La toux du chenil : Qu'est ce ? Que faire ?**

La toux de chenil est également appelée trachéobronchite infectieuse. Cette maladie est due à l'action conjuguée de plusieurs facteurs : des bactéries (dont la principale est *Bordetella Bronchiseptica*) et des virus (essentiellement Parainfluenza canin et un adéno-virus). Elle est extrêmement contagieuse.

La toux de chenil touche plus particulièrement les jeunes chiens (mais également d'autres animaux), le plus souvent sans gravité, en l'absence de traitement, elle peut être responsable de pneumonies. La maladie se transmet par voie aérienne. Elle est donc très contagieuse, surtout pour les chiens vivant en collectivité, participant à des expositions, à un dressage ...). Les symptômes débutent 3 à 11 jours après la contamination.

Dans les formes simples la toux domine. C'est une toux sèche, l'animal donne l'impression de vouloir cracher, déclenchée par l'effort (jeux, course ...), l'excitation, l'humidité ou une pression sur la trachée (collier).

Ce qu'il faut faire : Dès l'apparition des symptômes amener le chien chez le vétérinaire

Prévenir le club, pour que l'on déclenche le plus rapidement possible des mesures.

Ne ramener le chien qu'après sa guérison.

En prévention penser à amener vos gamelles pour donner à boire au chien, et ne pas laisser les autres chiens en profiter.

Il existe un vaccin sous diverses formes se renseigner chez votre vétérinaire.